

Viktig information inför och efter din implantatoperation:

Inför operation

- Lös ut recepten på antibiotika och värktabletter som tandläkaren ordinerat, på ditt apotek.
- **Påbörja antibiotikakuren kvällen innan operationsdagen.** Antibiotika förhindrar infektion som i sin tur kan äventyra läkningen.
- Tag gärna på bekväma kläder på operationsdagen.
- Om du är rökare uppmanas du att inte röka 1 vecka före operationen.
- Männens skall vara nyrakade runt munnen.
- 30 minuter före operationen kommer du erbjudas att få ett lugnande läkemedel. Om du får lugnande så får du EJ köra bil inom 24 timmar.
- Du bör undvika att köra bil till och från kliniken, se hellre till att någon annan kör.

Efter operation

- Det är mycket viktigt att tandimplantatet inte belastas under de närmaste veckorna efter operationen. Följ de matråd du fått. Du kan äta som vanlig, men undvik tugga/bita där det nya implantatet sitter.
- Du skall efter varje måltid skölja munnen, antingen med koksaltlösning (1tsk salt ½ liter kokande vatten) eller Andolex (recept).
- Egna tänder skall borstas som vanligt. Synliga skruvar skall även borstas.
- Protes får **ej** användas förrän den justerats! För tidigt användande av protesen kan äventyra hela behandlingen.
- Du kan svullna upp där vi har opererat. Om smärre, sipprande blödning skulle inträffa efter operationen kan den ofta hejdas genom på bitning av en sammanrullad kompress, lätt fuktad i saltvatten. Kompressen är främst mot svullnaden och inte mot blödning. Svullnaden dämpas vanligen inom 2-3 dagar.
- Ha gärna en extrakudde under huvudet de närmaste nätterna efter operationen.
- Smärta uppträder ofta efter en operation då bedövningen upphört att verka. Använd då de läkemedel mot smärta du fått utskrivet och enligt ordination. Svullnad och smärtan kan fortskrida 2-3 dagar, varefter den långsamt brukar avklinga.

Post och besöksadress:

Svea Tandklinik
Sveavägen 91
113 50 STOCKHOLM

Tel:

08 – 320 820 (även telsvar)
e-post: office@sveatandklinik.se
web: sveatandklinik.se

Öppettider:

Mån-tors 8-19
Fre 8-17
Lör 10.30 - 17

- Det är relativt vanligt att blåmärken uppkommer efter denna typ av operation.
- Alla implantat läker inte in lika, men följer du anvisningarna ökar du chansen för lyckad behandling.
- Tag kontakt med oss om något känns fel, om du är osäker eller vill fråga om något.
- Vid problem med **kraftig** blödning eller svullnad under första dygnet, ring den opererande tandläkaren. Följ annars rekommendationen att bita på en ihoprullad kompress i flera timmar.

Tandlösa patienter

De första 7 dagarna skall du hålla dig uteslutande till flytande kost (soppa, buljong, välling saftoch likande). Därefter kan du övergå till flytande och halvfast kost (pure, gröt, mos, ägg, fisk) till dess att suturerna tagits bort och proteserna justerats.

Glöm inte att rökning försämrar blodcirkulationen och läkningsprocessen samt att du följer våra rekommenderade efterkontroller för att behandlingens skall ha god prognos.

Hälsningar,
Noran De Basso
Klinikchef
Leg Tandläkare

Post och besöksadress:

Svea Tandklinik
Sveavägen 91
113 50 STOCKHOLM

Tel:

08 – 320 820 (även telsvar)
e-post: office@sveatandklinik.se
web: sveatandklinik.se

Öppettider:

Mån-tors 8-19
Fre 8-17
Lör 10.30 - 17