

Eftervård tandborttagning:

Efter att en tand eller flera har tagits bort finns det några saker som du bör tänka på.

Ytterst få drabbas av komplikationer som inte går att avhjälpa själv. Blir du osäker eller om det inte känns som det ska kan du alltid höra av dig till oss så kan vi göra en bedömning.

- Undvik att skölja munnen i 24 timmar. Sköljning gör att läkningen/blödningen tar längre tid. Efter 24 timmar börjar du skölja med koksalt efter varje måltid.
- Undvik att äta innan bedövningen släppt. Vänta i minst en timme.
- Undvik att röka/snusa i minst 72 timmar efter behandling.
- Borsta inte direkt på området där tanden suttit under den första tiden. Övriga delar kan du borsta som vanligt.
- Undvik att röra vid eller peta runt området där tanden suttit även om det känns som om något har fastnat där.
- Såret tar normalt 2-3 veckor att läka helt, men kan även dröja längre så, det är väldigt individuellt. Så länge det inte är utläkt så undvik irritation genom borstning eller att röra området.

Koksalt en liter vatten, 1 msk salt koka upp låt svalna, förvara i en flaska i kylskåp.

Vanliga känningar efter ingrepp:

Kompress :

Använd kompress i 1-3 dygn för att minska svullnad. Om det svullnar upp blir det tryck mot nerver och då gör det ont.

Blödning:

Såret blöder nästan alltid lite efter behandlingen. Det är helt normalt och normalt ingenting att oroa sig över. Om det dröjer innan blödningen upphör bör du använda de kompresser som du fått med dig från oss. Fukta dem lätt i lite ljummet vatten och bit ihop på kompressen i minst 15 minuter.

Svullnad:

Det händer att sårområdet svullnar upp mer eller mindre. En följd är att det kan bli lite svårare än vanligt att gapa. Svullnaden lägger sig efter ett tag och gapsvårigheter går efter hand tillbaka helt.

Värk:

Det kan hända att du känner dig öm och att det värker i munnen i ett par dagar. Värken ska minska efterhand. Du kan vid behov lindra den med värktabletter, men inte mer än ordinerat eller vad som står på förpackningen.

Kontakta oss:

- Om blödningen inte stoppar eller om blödningen börjar igen efter ett tag.
- Om svullnad och gapsvårigheter inte minskar.
- Om du får svårigheter att svälja eller dricka.
- Om värken inte avtar.
- Om du får feber eller blir allmänpåverkad tex blir svag i kroppen och inte kan komma upp ur sängen. Om det är helg ringer du till 1177.

Post och besöksadress

Svea Tandkliniken
Sveavägen 91
113 50 STOCKHOLM

Tel:

08 – 320 820 (även telsvar)
e-post: office@sveatandklinik.se
web:sveatandklinik.se

Öppettider:

Mån-tors 8-19
Fre 8-17
Lör-sön stängd